arXiv:1002.4751v1 [math.AG] 25 Feb 2010

Courbes de genre 3 avec S_3 comme groupe d'automorphismes

Jean-François Mestre.

1 Introduction

Soit k un corps, $a_1, a_2, a_3, a_4, X, Y, Z$ des indéterminées, $T_1 = X + Y + Z$, $T_2 = XY + YZ + ZX$, $T_3 = XYZ$; la courbe projective plane C_{a_1,a_2,a_3,a_4} à coefficients dans $k(a_1, a_2, a_3, a_4)$ d'équation

$$a_1T_1^4 + a_2T_1^2T_2 + a_3T_1T_3 + a_4T_2^2 = 0$$

a comme groupe d'automorphismes le groupe symétrique S_3 agissant de la façon naturelle sur $\{X, Y, Z\}$.

Nous étudions ici cette famille de courbes en vue d'applications au problème de la recherche de courbes de genre g, définies sur un corps fini $\mathbf{F}_q$, $q = p^n$, p premier, ayant beaucoup de points.

Plus précisément, notons $N_q(g)$ le maximum du nombre de points de $C(\mathbf{F}_q)$, lorsque C parcourt l'ensemble des courbes de genre g définies sur $\mathbf{F}_q$, et soit m_q la partie entière de $2\sqrt{q}$. La borne de Weil, raffinée par Serre ([Serre Harvard]), donne la majoration $N_q(g) \leq q + 1 + gm_q$. Une courbe C définie sur $\mathbf{F}_q$ dont le nombre de points sur $\mathbf{F}_q$ est égal à $q + 1 + gm_q$ est dite *optimale*, et le *défaut d'optimalité* est la quantité $D_q(g) = q + 1 + gm_q - N_q(g)$.

Notons que, pour q et g donnés, il peut ne pas exister de courbe optimale, y compris dans le cas du genre 1. À ce propos, Serre a posé la question suivante:

Pour g fixé, existe-t-il une constante $c(g)$ telle que, pour tout q, $D_q(g) \leq c(g)$?

Dans le cas du genre 3, rappelons les résultats suivants, en relation avec ceux obtenus ici:

- Top ([Top]) a trouvé de nombreux cas de courbes de genre 3 optimales en faisant une recherche systématique, en particulier pour $q \leq 100$.
- Lauter ([Lauter2]) a prouvé que, pour tout q, il existe une courbe C de genre 3 telle que $|q + 1 - \operatorname{Card} C(\mathbf{F}_q)| \geq 3m_q - 3$.
- Auer et Top ([Auer-Top]) ont prouvé que, pour n impair, $D_{3^n}(3) \leq 21$.

- Lorsque n est pair, et que $p \equiv 3 \mod 4$, il existe ([Ibukiyama], p. 2) une courbe optimale de genre 3, qui plus est hyperelliptique. Pour n pair ≥ 4, et $p = 2$, il existe une courbe de genre 3 optimale ([Na-Rit2]). Pour $p \equiv 1 \mod 4$ et $n \equiv 2 \mod 4$, on sait aussi qu'il existe une courbe optimale.

- Pour $p = 2$, Nart et Ritzenthaler ([Na-Rit1]) ont prouvé qu'il existe une courbe optimale pour une infinité de n impairs.

Plusieurs de ces résultats ont été obtenus en considérant la famille de courbes $ax^4 + by^4 + cz^4 + ey^2z^2 + fz^2x^2 + gx^2y^2 = 0$, dites *quartiques de Ciani* ([Ciani], [La-Ritz]), qui possèdent un groupe d'automorphismes isomorphe à $(\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})^2$.

L'utilisation des courbes C_{a_1,a_2,a_3,a_4} ci-dessus, contenant le groupe symétrique S_3 comme groupe d'automorphismes, permet d'obtenir les résultats suivants:

Théorème.

- *Soit $q = 3^n$, n impair. Si E est une courbe elliptique définie sur $\mathbf{F}_q$ dont l'invariant modulaire n'est pas dans $\mathbf{F}_3$, il existe une courbe de genre 3 dont la jacobienne est isogène sur $\mathbf{F}_q$ à E^3.*

- *Soit $q = 3^n$, avec n impair ≥ 7; si m_q n'est pas divisible par 3 (donc pour une infinité de n), il existe une courbe de genre 3 optimale (et aussi une courbe dont le nombre de points est $q + 1 - 3m_q$).*

  Dans le cas où n est pair, il existe des courbes optimales non hyperelliptiques.

- *Soit $q = 7^n$, n impair, et a un entier premier à 7, $|a| \leq m_q$; si a est divisible par 3, et est un carré $\mod 7$, il existe une courbe de genre 3 dont le nombre de points est $q + 1 - 3a$. Si $a \equiv 1, 4, 5, 7, 8$ ou $11 \mod 12$, il existe une courbe de genre 3 dont le nombre de points est $q+1-3a$ et une courbe de genre 3 dont le nombre de points est $q + 1 + 3a$.*

Corollaire.

- *Pour tout n, on a $D_{3^n}(3) \leq 3$.*

- *Pour tout n, on a $D_{7^n}(3) \leq 9$*

Par ailleurs, les courbes C_{a_1,a_2,a_3,a_4} permettent fréquemment d'obtenir des courbes optimales: par exemple (cf. 2.2), pour p premier ≤ 10000, on obtient, par spécialisation convenable de courbes de cette famille, une courbe optimale sur $\mathbf{F}_p$ dans environ 90% des cas.

La première section est consacrée au cas où la caractéristique de k est différente de 2 et 3; on y donne d'abord un formulaire concernant les courbes C_{a_1,a_2,a_3,a_4}. Leur jacobienne est isogène à $E_1^2 \times E_2$, où E_1 (resp. E_2) est la courbe quotient de C par l'un quelconque des sous-groupes d'ordre 2 (resp. par

le sous-groupe d'ordre 3) de S_3, et il existe un isomorphisme galoisien commutant à l'accouplement de Weil entre les points d'exposant 3 de E_1 et de E_2.

Réciproquement, si E_1 et E_2 sont deux courbes elliptiques sur k, d'invariants distincts et distincts de 0 et 1728, il existe douze courbes de genre 3 sur $\overline{k}$ de la forme C_{a_1,a_2,a_3,a_4} dont la jacobienne est isogène à $E_1^2 \times E_2$.

Dans la sous-section suivante, on applique ces formules au cas où E_1 et E_2 ont le même invariant modulaire, ce qui donne une famille de courbes de genre 3 à un paramètre t. Cela permet en particulier de construire une courbe de genre 3 dont la jacobienne est isogène sur $\mathbf{Q}$ au cube d'une courbe à multiplications complexes, dans le cas où l'anneau d'endomorphismes de cette courbe a comme discriminant $-3, -7, -19, -43, -67, -163, -16$ ou -28.

Nous traitons ensuite le cas où $p = 7$, avant de finir dans la dernière section par le cas de la caractéristique 3.

2 Caractéristique différente de 2 et 3

NOTATIONS.

- Soit $j \neq 0, 1728$. Dans ce qui suit, on note $E(j)$ la courbe elliptique d'équation
$$y^2 = x^3 - 3\frac{j}{j-1728}x - \frac{3j}{4(j-1728)}.$$
Cette courbe est d'invariant j.
- On note $\rho \in \overline{k}$ une racine de $x^2 + x + 1$. Remarquons que $(\rho : \rho^2 : 1)$ est un point de la courbe C_{a_1,a_2,a_3,a_4}.
- Si E est une courbe elliptique, on note $E[3]$ le groupe de ses points d'exposant 3.

2.1 Isogénies d'ordre 3 des courbes elliptiques

Soit E une courbe elliptique d'équation $y^2 = p(x)$, avec $p(x) = x^3 + ax + b$; l'équation aux abscisses de ses points d'ordre 3 est alors $f_3(x) = 2pp" - p'^2 = 3x^4 + 6ax^2 + 12xb - a^2$. Par une homographie convenable, on peut ramener les quatre racines de f_3 à $\infty, 1, \rho, \rho^2$.

L'ensemble des birapports des 24 permutations de ces racines est égal à $\{-\rho, -\rho^2\}$, donc le groupe des homographies conservant les quatre racines de f_3 est isomorphe au groupe alterné A_4. Si $f : E[3] \to E[3]$ est un isomorphisme préservant l'accouplement de Weil, l'équation aux abscisses de f restreinte à $E[3] - \{0\}$ est donnée par une telle homographie.

Par suite, si E' est une seconde courbe elliptique, d'équation $y^2 = x^3 + a'x + b'$, et si $g_3 = 3x^4 + 6a'x^2 + 12xb' - a'^2$, il existe douze homographies envoyant les racines de f_3 sur celles de g_3, et elles correspondent aux isomorphismes de $E[3]$ sur $E'[3]$ commutant à l'accouplement de Weil.

La courbe elliptique universelle possédant un point d'ordre 3 est la courbe d'équation

$$E_t : \ y^2 + xy + ty = x^3,$$

le point $(0,0)$ étant d'ordre 3 et t 'etant un paramètre. Son invariant modulaire est égal à

$$j_3(t) = \frac{(24t-1)^3}{t^3(27t-1)}.$$

La courbe quotient de E_t par le groupe d'ordre 3 engendré par $(0,0)$ est la tordue quadratique par -3 de la courbe $E_{-t-1/27}$.

2.2 Formulaire

Si a_3 ou a_4 est nul, la courbe C_{a_1,a_2,a_3,a_4} n'est pas irréductible; on peut donc supposer $a_4 = 1$ et $a_3 \neq 0$; de plus, comme la caractéristique de k est ici supposée différente de 2 et 3, on peut se ramener à $a_3 = 2$ par une transformation de la forme $X' = X + aT_1, Y' = Y + aT_1, Z' = Z + aT_1$, qui commute aux matrices de permutation et qui est inversible pour $3a + 1 \neq 0$, en prenant $a = \dfrac{2-a_3}{3a_3}$. On désigne désormais par C_{a_1,a_2} la courbe d'équation

$$a_1T_1^4 + a_2T_1^2T_2 + 2T_1T_3 + T_2^2 = 0.$$

Son discriminant vaut $256\ (27\,a_1 + 5 + 9\,a_2)\,d^3$, où

$$d = -432\,a_1 + 72\,{a_2}^2 + 76\,{a_2}^3 - 216\,{a_2}^2a_1 + 432\,{a_1}^2 - 432\,a_1\,ta_2 + 27\,{a_2}^4.$$

On note également $q_{a_1,a_3}(x,y)$ la forme non homogène de l'équation de C_{a_1,a_2} obtenue en posant $x = X/Z, y = Y/Z$.

Proposition 2.1.

1) *La courbe E_1 quotient de C_{a_1,a_2} par le groupe engendré par l'involution $(X,Y,Z) \mapsto (Y,X,Z)$ est une courbe elliptique d'équation affine*

$$y^2 = x^3 - (3+2a_2)x - 4a_1 + 2 + 2a_2 + a_2^2$$

et d'invariant modulaire

$$J_1 = 6912\frac{(2a_2+3)^3}{d}.$$

Le morphisme $\phi_1 : \ C_{a_1,a_2} \to E_1$ est donné par

$$\phi_1 : \begin{cases} x = & \frac{X+Y-Z}{T_1}, \\ y = & \frac{2(Z^2-XY)+a_2T_1^2+4T_2}{T_1^2} \end{cases}$$

Le point à l'infini de E_1 est l'image par ϕ_1 de $(\rho : \rho^2 : 1)$ et l'on a

$$\phi_1^*(\frac{dx}{y}) = \frac{(y-x)dx}{q_y},$$

où $q_y = \dfrac{\partial}{\partial y} q_{a_1,a_2}$.

Si l'on quotiente C_{a_1,a_2} *par le groupe engendré par l'involution* $\tau : (X,Y,Z) \mapsto (X,Z,Y)$ *(resp.* $(X,Y,Z) \mapsto (X,Z,Y)$*), on trouve la même courbe* E_1*; l'image réciproque de* $\frac{dx}{y}$ *est* $\frac{(x-1)dx}{q_y}$ *(resp.* $\frac{(1-y)dx}{q_y}$*);*

La somme de ces trois formes différentielles vaut 0*, et elles sont deux-à-deux linéairement indépendantes.*

La jacobienne de C_{a_1,a_2} *est donc isogène à* $E_1^2 \times E_2$*, où* E_2 *est une courbe elliptique.*

2*) La courbe* E_2 *est la jacobienne de de la courbe de genre* 1 *quotient de* C_{a_1,a_2} *par le groupe d'ordre* 3 *engendré par* $\sigma : (X,Y,Z) \mapsto (Y,Z,X)$*; une équation de* E_2 *est*

$$y^2 = x^3 + Ax + B,$$

avec

$$\begin{aligned} A = \quad & -48 - 128\,a_2 - 648\,{a_2}^2 + 3456\,a_1a_2 - 648\,{a_2}^3 + 1944\,a_1{a_2}^2 \\ & -243\,{a_2}^4 + 3168\,a_1 - 3888\,{a_1}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B = \quad & 512\,a_2 - 2400\,{a_2}^2 + 46080\,a_1a_2 - 7200\,{a_2}^3 + 77760\,a_1{a_2}^2 \\ & -9720\,{a_2}^4 - 124416\,{a_1}^2a_2 + 54432\,a_1{a_2}^3 - 5832\,{a_2}^5 - 69984\,{a_1}^2{a_2}^2 \\ & +17496\,a_1{a_2}^4 - 1458\,{a_2}^6 + 128 + 19328\,a_1 - 120960\,{a_1}^2 + 93312\,{a_1}^3 \end{aligned}$$

3*) Le quotient* J_1/J_2 *des invariants modulaires de* E_1 *et* E_2 *est un cube* M_3^3*, où*

$$M_3 = \frac{A}{16\,(27\,a_1 + 5 + 9\,a_2)\,(3 + 2\,a_2)}.$$

4*) Il existe un isomorphisme galoisien, commutant à l'accouplement de Weil, entre* $E_1[3]$ *et* $E_2[3]$*.*

Plus précisément, il existe une homographie définie sur k *envoyant les abscisses des points d'ordre* 3 *de* E_1 *sur les abscisses des points d'ordre* 3 *de* E_2*.*

5*) Soit* J_1 *un élément de* $k - \{0, 1728\}$*. L'ensemble des courbes* C_{a_1,a_2} *telles que* E_1 *a comme invariant* J_1 *est une famille à un paramètre* v*; on a*

$$\begin{cases} a_1 = & \frac{N}{16(J_1-1728)^2} \\ a_2 = & \frac{3}{2}\,\frac{v^2J_1 - J_1 + 1728}{J_1 - 1728} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{avec } N = \quad & 14929920 - 17280\,J_1 + 5\,{J_1}^2 + 10368\,v^2J_1 - 6\,v^2{J_1}^2 \\ & -13824\,v^3J_1 + 8\,v^3{J_1}^2 + 9\,v^4{J_1}^2. \end{aligned}$$

La courbe E_1 *est tordue de* $E(J_1)$ *par* v*.*

L'invariant de E_2 *est* $J_2 = J_1\,U^3/V^3$*, avec*

$$\begin{aligned} U = \quad & -2985984 + 35831808\,v + {J_1}^2 - 3456\,J_1 - 93312\,v^2J_1 + 54\,v^2{J_1}^2 \\ & +81\,v^4{J_1}^2 + 108\,v^3{J_1}^2 + 12\,v{J_1}^2 - 41472\,vJ_1 - 186624\,v^3J_1 - 559872\,v^4J_1 \\ & \text{et} \\ V = \quad & 243\,v^4{J_1}^2 + 216\,v^3{J_1}^2 + 54\,v^2{J_1}^2 - {J_1}^2 + 3456\,J_1 \\ & -2985984 - 93312\,v^2J_1 - 373248\,v^3J_1. \end{aligned}$$

La courbe E_2 a comme équation $y^2 = x^3 + Cx + D$, avec

$$\begin{cases} C = & -3v^2 J_1(J_1 - 1728)J_2 V^3 \\ D = & 2v^3 J_1(J_1 - 1728)(J_2 - 1728)V^3 \end{cases}$$

6*) Réciproquement, à tout couple d'invariants distincts J_1 et J_2 dans $k - \{0, 1728\}$ correspondent douze courbes C_{a_1,a_2} définies sur $\overline{k}$, dont les jacobiennes sont isogènes à $E(J_1)^2 \times E(J_2)$. Plus précisément, soit h l'une des 12 homographies envoyant les abscisses des points d'ordre 3 de $E(J_1)$ sur les abscisses des points d'ordre 3 de $E(J_2)$; le paramètre v du point 5) est donné par*

$$\frac{1}{v} = 3h(\infty).$$

Remarque 2.1.
Soit $\Phi_2 = \Phi_1 \circ \sigma : C_{a_1,a_2} \to E_1$, et $\Psi : C_{a_1,a_2} \to E_2 = C_{a_1,a_2}/ < \sigma >$ un revêtement de degré 3 tel que $\Psi(\rho : \rho^2 : 1) = 0$. Soit $f : E_1^2 \times E_2 \to \mathrm{Pic}^0(C_{a_1,a_2})$ définie par

$$(P, Q, R) \mapsto \Phi_1^*((P) - (0)) + \Phi_2^*((Q) - (0)) + \Psi^*((R) - (0))$$

et $g : \mathrm{Pic}^0(C_{a_1,a_2}) \to E_1^2 \times E_2$ définie par

$$D \mapsto (\Phi_1(D), \Phi_2(D), \Psi(D));$$

l'application composée $g \circ f : E_1^2 \times E_2 \to E_1^2 \times E_2$ est donnée par la matrice $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Par suite, le degré de f (resp. de g) est égal à 9.

La jacobienne de C_{a_1,a_2} est obtenue par recollement ([Serre Harvard], p. 37 et seq. ou [Lauter2], p. 95) de E_1^2 muni de la polarisation $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ et de E_2 munie de la polarisation $3\,Id$, via l'isomorphisme galoisien de $E_1[3]$ sur $E_2[3]$ du point 4) ci-dessus.

2.3 Exemples

On peut faire une recherche systématique des courbes optimales de genre 3 de la forme C_{a_1,a_2}, par l'algorithme suivant: soit k un corps fini, de cardinal q, et J l'ensemble, éventuellement vide, des invariants des courbes elliptiques dont la valeur absolue de la trace du Frobenius sur $\mathbf{F}_q$ vaut m_q[1]. Pour tout couple j, j' d'éléments de J, on calcule les racines de l'équation $J_2(j, v) = j'$, puis le nombre de points de la courbe de genre 3 associée à chacune de ces racines par les formules ci-dessus.

[1] On exclut les cas $m_q^2 - 4q = -3, -4, -8, -11$, car d'après [Lauter2], Appendice, il n'existe pas de courbe optimale dans ces cas.

Pour les nombres premiers $p \leq 10723$, i.e. les 1308 premiers nombres premiers, cette méthode échoue à trouver une courbe de genre 3 dont le nombre de points est $p+1+3m$ dans 97 cas.

Pour ces cas, le nombre de classes de m^2-4p est en général égal à 1, sauf dans 10 cas, où on trouve $-20, -24, -35, -100, -123, -187$, de nombre de classes 2, et -59, de nombre de classes 3.

Les 19 nombres premiers < 1000 pour lequel la méthode précédente ne permet pas de trouver une courbe optimale sont 53 [2], $167, 173, 193, 293, 311, 347, 353, 359, 479, 523, 557, 569, 661, 709, 773, 787, 823, 997$.

On peut faire de même lorsque $q = p^n$ n'est pas premier, et jouer alors avec le fait que J_1 et $J_2 = J_1^p$ peuvent être distincts: soit par exemple $q = 19^3$; en prenant $J_1 = J_2$, où J_1 est l'invariant d'une courbe elliptique optimale sur $\mathbf{F}_q$, on trouve une courbe de genre 3 dont le nombre de points est $q+1-3m_q$; par contre, en prenant $J_2 = J_1^{19}$, on trouve une courbe optimale.

2.4 Cas où $J_1 = J_2$

On cherche ici les courbes C_{a_1,a_2} telles que $J_1 = J_2$; avec les notations précédentes, $J_1/J_2 = M_3^3$, donc M_3 est alors égal à $1, \rho$ ou ρ^2.

2.4.1 $M_3 = 1$

L'équation $M_3 = 1$ s'écrit

$$\begin{aligned}&-288 - 720\,a_2 - 936\,{a_2}^2 + 2592\,a_1a_2 - 648\,{a_2}^3 + 1944\,a_1{a_2}^2\\&-243\,{a_2}^4 + 1872\,a_1 - 3888\,{a_1}^2 = 0\end{aligned}$$

courbe rationnelle que l'on peut paramétrer par

$$\begin{cases} a_1 = \frac{1}{432}\,\frac{112\,t^4+272\,t^3+408\,t^2+296\,t+127}{(t^2+t+1)^2}, \\ a_2 = -\frac{8\,t^2+10\,t+9}{6(t^2+t+1)} \end{cases}$$

Dans ce qui suit, on note C_t la courbe d'équation

$$(t^2+t+1)^2(a_1T_1^4 + a_2T_1^2T_2 + 2T_1T_3 + T_2^2) = 0,$$

a_1 et a_2 étant les fractions rationnelles en t ci-dessus.

On a alors $J_1 = 1728t^3$; la courbe E_2 a comme équation $y^2 = x^3 - 3t(t^3-1)x - 2(t^3-1)^2$, et la courbe E_1 est tordue de E_2 par $-3(t^2+t+1)$.

Le discriminant de C_t est $2^{118}3^{74}(t-1)^9(t^2+t+1)^{43}$.

Remarques 2.3.1.

1) D'après [Serre], p. 305, l'invariant modulaire d'une courbe elliptique E est un cube si et seulement si le degré de l'extension obtenue par adjonction des points d'ordre 3 de la courbe est premier à 3.

[2] Comme me l'a indiqué C. Ritzenthaler, M. Nitzberg a montré que $x^4+y^4+z^4 = 0$ est optimale pour $p = 53$ ([Serre Harvard], p. 72).

2) Supposons que $k = \mathbf{F}_q$ (q impair).

a) Si $q \equiv 2 \mod 3$, j est toujours un cube (comme tout élément de k).

b) Si $q \equiv 1 \mod 3$, une condition suffisante pour que j soit un cube est que $a_q = q + 1 - N_q(E)$ soit divisible par 3; en effet, dans ce cas, ni E ni sa tordue quadratique n'ont de point d'ordre 3 rationnel sur $\mathbf{F}_q$, et le polynôme f_3 des abscisses des points d'ordre 3 de E et de sa tordue n'a donc pas de racine dans $\mathbf{F}_q$. Par suite, il n'a pas de facteur irréductible de degré 3.

Par ailleurs, la relation

$$(t^3 - 1)^2 = (t^2 + t + 1)((t)^2 + t + 1)((t\rho^2)^2 + t\rho^2 + 1)$$

montre que, dès que j est un cube, il existe $t \in k$ tel que $j = 1728t^3$ et $t^2 + t + 1$ est un carré dans k.

3) Lorsque $t^2 + t + 1 = 0$, i.e. $t = \rho$ ou ρ^2, on a $J_1 = J_2 = 1728$; la quartique C_t a un discriminant nul, et sa réduction modulo $t^2 + t + 1$ est, sur une extension convenable de $k(t)$, la courbe hyperelliptique $y^2 = x(x^6 - 1)$. Pour le voir, il suffit d'écrire l'équation de la quartique sous la forme $A^2 + \varepsilon B + O(\varepsilon^2) = 0$ ([Clemens], p. $155 - 157$, ou encore [Elkies], p. 82), $A = 0$ étant l'équation d'une conique Co non singulière; lorsque ε tend vers 0, la quartique "tend" vers la courbe hyperelliptique revêtement double de la conique Co ramifié aux points d'intersection de Co et de la courbe d'équation $B = 0$.

Ici, on paramètre la conique $t^2 + t + 1 = u^2$ par $\begin{cases} t = \rho^2 \frac{\varepsilon^2 - \rho^2}{\varepsilon^2 - 1} \\ u = -\sqrt{-3} \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 - 1} \end{cases}$.

Pour $\varepsilon = 0$, on a $(t, u) = (\rho, 0)$.

Après le changement de variables $(X, Y, Z) \mapsto (X, Y, S)$, avec $X + Y + Z = 2Su$, la quartique C_t s'écrit $A^2 - 12\varepsilon B + O(\varepsilon^2) = 0$, où $A = S^2 - \sqrt{-3}(X^2 + XY + Y^2)$ et $B = S(X + Y)(A - \sqrt{-3}XY)$.

En paramétrant la conique Co d'équation $A = 0$ par $\mu = \sqrt[4]{-3}(X - \rho Y)/S$, les huit paramètres des points d'intersection de Co et de la quartique d'équation $B = 0$ sont $0, \infty, \pm\rho, \pm\rho^2, \pm 1$; par suite, sur $\overline{k}$, la courbe hyperelliptique "limite" de C_t quand t tend vers ρ a comme équation $y^2 = x(x^6 - 1)$.

2.4.2 Cas où $k = \mathbf{Q}$ et E_1 de type CM

Si $k = \mathbf{Q}$, E_1 et E_2 ne sont pas k-isomorphes, puisque tordues l'une de l'autre par $-3(t^2 + t + 1)$. Néanmoins, si elles sont à multiplications complexes, elles peuvent être isogènes sur $\mathbf{Q}$; dans ce cas, la trace du Frobenius $\mod p$ de C_t, pour p premier et premier au discriminant de la courbe, est égale au triple de celle de E_1.

Les 13 courbes elliptiques à multiplications complexes définies sur $\mathbf{Q}$ ont comme invariant

$$2^6 3^3, 2^6 5^3, 0, -3^3 5^3, -2^{15}, -2^{15} 3^3, -2^{18} 3^3 5^3, -2^{15} 3^3 5^3 11^3,$$

$$-2^{18} 3^3 5^3 23^3 29^3, 2^3 3^3 11^3, 2^4 3^3 5^3, 3^3 5^3 17^3, -3\ 2^{15} 5^3,$$

les anneaux d'endomorphismes associés étant ceux de discriminant

$$-4, -8, -3, -7, -11, -19, -43, -67, -163, -16, -12, -28, -27.$$

À part le onzième et le treizième, tous ces invariants sont des cubes, les valeurs de t associées étant

$$1, 5/3, 0, -5/4, -8/3, -8, -80, -440, -53360, 11/2, \frac{85}{4}.$$

La valeur $t = 1$ donne une quartique singulière; pour les dix autres valeurs, on obtient dix courbes de genre 3. À des facteurs carrés près, les quantités $-3(t^2 + t + 1)$ valent respectivement $-3, -3, -7, -3, -19, -43, -67, -163, -1, -7$, les anneaux d'endomorphismes ayant comme discriminant

$$-8, -3, -7, -11, -19, -43, -67, -163, -16, -28.$$

À part le premier et quatrième cas, les courbes E_1 et E_2 sont donc $\mathbf{Q}$-isogènes, et on obtient ainsi huit quartiques définies sur $\mathbf{Q}$ dont la jacobienne est $\mathbf{Q}$-isogène au cube d'une courbe elliptique à multiplications complexes, les anneaux d'endomorphismes étant $-3, -7, -19, -43, -67, -163, -16, -28$.

Exemples.- 1) Pour $t = -5/4$, on trouve une quartique $\overline{\mathbf{Q}}$-isomorphe à la courbe de Klein, d'équation $x^3y+y^3+x = 0$, mais qui ne lui est pas $\mathbf{Q}$-isomorphe (la courbe de Klein n'ayant pas d'involution définie sur $\mathbf{Q}$). Plus précisément, l'isomorphisme entre la courbe de Klein et la quartique ci-dessus est donné par la matrice

$$\begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ u_3 & u_1 & u_2 \\ u_2 & u_3 & u_1 \end{pmatrix}$$

avec u_1^4 racine de $X^3 + 26X^2 + 13X + 1$, $u_2 = \frac{1}{29}u_1(5u_1^8 + 126u_1^4 - 30)$ et $u_3 = \frac{1}{29}u_1(17u_1^8 + 440u_1^4 + 159)$.

Si δ est le déterminant de cette matrice, on a $\delta^4 = -14^4$.

La remarque 3 du paragraphe précédent permet de retrouver le fait que, modulo 7, la quartique de Klein se réduit en une courbe hyperelliptique. (De même, les quartiques associées aux courbes à multiplications complexes par l'anneau des entiers de $-19, -43, -67, -163$ se réduisent modulo $19, 43, 67, 163$ en une courbe hyperelliptique).

2) Pour $t = -5/4$ (resp. $t = 85/4$), qui correspondent aux discriminants -7 et -28, on obtient une quartique dont la jacobienne est $\mathbf{Q}$-isogène au cube de la courbe $y^2 = x^3 - 35x + 98$ (resp. $y^2 = x^3 - 1933155x - 1034488098$). Ces deux courbes sont 2-isogènes sur $\mathbf{Q}(\sqrt{57})$, mais pas sur $\mathbf{Q}$. Par suite, si p est un nombre premier tel que $\left(\frac{p}{57}\right) = -1$, les traces du Frobenius $\bmod p$ sont opposées d'une quartique à l'autre. En particulier, si $p = 4b^2 + 7$, avec $b \geq 4$ (ce qui assure que la partie entière de $2\sqrt{p}$ est égale à $2b$), et si $\left(\frac{p}{57}\right) = -1$, on obtient ainsi une quartique optimale et une quartique minimale sur $\mathbf{F}_p$. Par exemple, les nombres premiers < 10000 vérifiant ces conditions sont

$$\{151, 263, 331, 491, 907, 1031, 1163, 1451, 1607, 2311, 4363, 5483, 5783\}.$$

3) Dans les cas de discriminant $-19, -43, -67$ et -163, on obtient des modèles sur $\mathbf{Q}$ de courbes trouvées par Ritzenthaler dans [Ritzenthaler], à savoir celles dont la dernière entrée dans la Table 2 de [*ibid.*] vaut 2×6.

2.4.3 Le cas où $k = \mathbf{F}_{7^n}$

PROPOSITION 2.3.3. *Soit n un entier impair, $q = 7^n$, et E une courbe elliptique définie sur $k = \mathbf{F}_q$, dont la trace du Frobenius a est congrue à $9, 15$ ou $18 \bmod 21$. Il existe une courbe de genre 3, définie sur k, dont le nombre de points vaut $7^n + 1 - 3a$.*

En effet, on a alors $a \equiv 0 \mod 3$, donc d'après ce qui précède, l'invariant de E est un cube $1728t^3$, où l'on peut choisir t tel que $t^2 + t + 1$ est un carré dans k.

Il existe donc une courbe de genre 3 définie sur k dont la jacobienne est isogène à E_2^3, où E_2 a comme équation $y^2 = x^3 + Ax + B$, avec $A = -3t(t^3 - 1, B = -2(t^3 - 1)^2$.

Or, si E a comme équation $y^2 = x^3 + \alpha x + \beta$, on sait ([Manin], théorème 1) que a est congrue modulo 7 à la norme de son invariant de Hasse, soit $(3\beta)^{1+7+\ldots+7^{n-1}}$. Par hypothèse, c'est un carré dans $\mathbf{F}_7$.

Comme la trace du Frobenius de E_2 est aussi un carré, puisque $3B = (t^3-1)^2$, E_2 est donc k-isomorphe à E, d'où le résultat.

COROLLAIRE 2.3.3. *Soit $k = \mathbf{F}_q$ un corps fini de caractéristique 7; il existe une courbe de genre 3 définie sur $\mathbf{F}_q$ dont le nombre de points est $\geq q + 1 + 3(m_q - 11)$.*

2.4.4 Le cas $M_3 = \rho$

On suppose ici que $\rho \in k$; la courbe d'équation $M_3 = \rho$ admet une paramétrisation rationnelle par un paramètre t tel que $J_1 = J_2 = \frac{(-1+24\,t)^3}{t^3(-1+27\,t)}$. On reconnaît l'invariant modulaire de la courbe E_t d'équation $y^2 + xy + ty = x^3$, i.e. la courbe elliptique universelle ayant un point d'ordre 3 (cf. 2.1). Par ailleurs, alors que, dans le cas $M_3 = 1$, E_1 et E_2 sont tordues quadratiques l'une de l'autre par $-3(t^2 + t + 1)$, ici E_1 et E_2 sont $k(t)$-isomorphes, et tordues quadratiques par $(\rho - 1)(36t + \rho - 1)$ de la courbe E_t.

Supposons que $k = \mathbf{F}_{7^n}$, n impair, et prenons $\rho = 2$. Si E est une courbe elliptique sur k dont le nombre de points est $7^n + 1 - a$, et que $a \equiv -1 \mod 3$, le courbe E a un point d'ordre 3. Soit F la courbe quotient de E par le groupe engendré par ce point. D'après 2.1, il existe $t \in k$ tel que $E = E_t$ et, -3 étant un carré dans k, $F = F_{-t+1/27}$. La courbe de genre 3 associée à t (resp. $-t+1/27$) est isogène au cube de E ou de sa tordue quadratique, selon que $t+1$ est un carré ou non (resp. au cube de F ou de sa tordue quadratique, selon que $36(1/27 - t) + \rho - 1 = -t$ est un carré ou non). Comme, à un carré près, le discriminant de E_t est égal à $t(1 + t)$, on en déduit que, si a est impair, i.e. si E n'a pas de point d'ordre 2 sur k, ou si $a \equiv 0 \mod 4$, dans lequel cas, quitte

à remplacer E par une courbe 2-isogène, E a trois points d'ordre 2, il existe un unique résidu quadratique dans l'ensemble $\{-t, 1+t\}$.

Donc, si $a \not\equiv -1 \mod 3$ et $a \not\equiv 2 \mod 4$, il existe une courbe de genre 3 isogène à E^3 et une autre isogène au cube de la tordue de E. En remplaçant E par sa tordue quadratique, on a le même résultat si $a \equiv 1 \mod 3$ et $a \not\equiv 2 \mod 4$, d'où la partie 2 du théorème énoncé en introduction. Le point 2 du corollaire s'ensuit (et peut être précisé: à moins que $m_q \equiv 36, 51, 58$ ou $78 \mod 84$, le défaut est au plus 6).

3 Le cas de caractéristique 3

Dans ce paragraphe, les corps considérés sont de caractéristique 3.

3.1 Le cas $a_3 \neq 2$

On considère comme précédemment la famille de courbes d'équation

$$a_1 T_1^4 + a_2 T_1^2 T_2 + a_3 T_1 T_3 + T_2^2.$$

Dans ce paragraphe, on suppose $a_3 \neq 2$. Par une transformation linéaire de la forme

$$X' = X + aT_1, Y' = Y + aT_1, Z' = Z + aT_1,$$

qui est inversible pour tout a, on se ramène à $a_2 = 0$ en prenant $a = -\frac{a_2}{1+a_3}$.

On note désormais, dans ce qui suit, C_{a_1,a_3} la courbe d'équation

$$a_1 T_1^4 + a_3 T_1 T_3 + T_2^2.$$

Son discriminant est $2(a_3+1)^9 a_1^3 a_3^{12}$.

La courbe E_1 quotient de C par l'une quelconque des involutions naturelles de C a comme équation

$$v^2 = u^3 + a_3(a_3+1)u^2 + 2a_3^2 a_1,$$

son invariant modulaire étant

$$J_1 = \frac{a_3(a_3+1)^3}{a_1},$$

un morphisme du modèle affine de C obtenu en posant $x = X/Z, y = Y/Z$ vers E_1 étant donné par

$$u = \frac{-a_3}{T_1}, \quad v = \frac{T_2 - a_3 T_1}{T_1^2}.$$

La courbe E_2 quotient de C par le groupe d'ordre 3 engendré par $(x, y, z) \mapsto (y, z, x)$ a comme équation

$$v^2 = u^3 + a_3(a_3+1)u^2 + a_1 a_3^5,$$

le morphisme de C vers E_2 étant donné par

$$\begin{cases} u = 2a_3^2 \frac{a_1UV+a_3}{(U+V)(2+a_1(U+V))} \\ v = (U-V)\frac{a_1a_3^4+u^2}{a_3^2} \end{cases}$$

avec $U = \frac{x^2y+y^2+x}{xy}$ et $V = \frac{y^2x+x^2+y}{xy}$. L'invariant de E_2 est

$$J_2 = \frac{2(a_3+1)^3}{a_1a_3^2}$$

et donc

$$\frac{J_1}{J_2} = -a_3^3.$$

Par ailleurs, les coefficients de u^2 dans les équations de E_1 et E_2 sont les mêmes, et sont non nuls. Comme la trace du Frobenius de E_1 (resp. E_2) est la norme de l'invariant de Hasse de E_1, qui en caractéristique 3 est le coefficient de u^2 dans une équation de Weierstrass de la courbe, les deux courbes E_1 et E_2 ont des traces de Frobenius égales et non nulles modulo 3; elles ne peuvent donc pas être opposées.

Par suite, si $k = \mathbf{F}_{3^n}$, et si J_1 et J_2 sont deux éléments distincts et non nuls de k, il existe une courbe de genre 3 définie sur k, dans la famille ci-dessus. dont la jacobienne est isogène à $E_1^2 \times E_2$, où E_1 (resp. E_2) a comme invariant J_1 (resp. J_2): le coefficient a_3 est déterminé par $J_1/J_2 = -a_3^3$, d'où $a_1 = \frac{a_3(a_3+1)^3}{J_1}$.

Supposons désormais n impair ≥ 3, et $q = 3^n$. Pour tout $j \in k - \mathbf{F}_3$, on obtient ainsi une courbe C associée au couple $(J_1 = j, J_2 = j^3)$, le coefficient a_3 correspondant vérifiant $a_3^3 = -J_1/J_2 = -1/J_1^2$, et une courbe C' associée au couple (J_2, J_1), le coefficient a_3' correspondant étant égal à $1/a_3$.

Le coefficient en x^2 de la courbe E_1 est $a_3(a_3+1)$, alors que celui de la courbe E_1' est $a_3'(1+a_3')$. Le quotient de ces deux termes vaut $a_3^3 = -1/J_1^2$, et n'est donc pas un carré. Par suite, les courbes E_1 et E_1' sont tordues quadratiques l'une de l'autre, et la jacobienne de C' est la tordue quadratique de celle de C.

D'après [Lauter2], p. 92 et p. 99, il existe a tel que $a^2 - 4 \times 3^n = -8$ (resp. -11) si et seulement si $n = 1$ ou $n = 3$ (resp. $n = 1$ ou 5). Par suite, pour $n \geq 7$, pour tout entier a non divisible par 3 et tel que $|a| \leq 2\sqrt{q}$, où $q = 3^n$, il existe une courbe elliptique d'invariant dans $\mathbf{F}_q - \mathbf{F}_3$ et dont la trace du Frobenius vaut a.

On en déduit la proposition suivante:

Proposition 3.1 . *Soit n un entier impair ≥ 7, et $q = 3^n$. Si m_q n'est pas divisible par 3, il existe deux courbes de genre 3 définies sur $\mathbf{F}_q$, l'une optimale, i.e. dont le nombre de points vaut $q+1+3m_q$, l'autre dont le nombre de points vaut $q+1-3m_q$.*

Remarques 3.1.

1) Il existe une infinité de n impairs pour lesquels $m_q \not\equiv 0 \bmod 3$. En effet, $m_q \equiv 0 \bmod 3$ si et seulement si le $(n-1)/2$-ième terme de la mantisse du

développement 3-adique $1.1101120222201212202001\ldots$ de $2\sqrt{3}$ est nul. Comme $2\sqrt{3}$ n'est pas un nombre rationnel, les termes de ce développement ne peuvent pas être tous nuls à partir d'un certain rang.

Dans le cas où $m_q \equiv 0 \mod 3$, (ce qui, expérimentalement, pour n impair, semble arriver dans une proportion d'environ 1/3), d'après ([Serre Harvard], p. 7 ou [Lauter2], Table 1, le défaut est au moins 2, et s'il est 2 les traces du Frobenius sont $-(m_q + 1 - 4\cos^2 \frac{\pi}{7})$ et ses deux conjuguées.

Ceci exige en particulier que la partie fractionnaire de m_q soit supérieure à $1 - 4\cos^2 \frac{3\pi}{7}$. Par exemple, pour n impair ≤ 400, ceci arrive pour $n = 15, 47, 53, 69, 159, 329, 349, 375, 383, 399$.

2) Il n'existe qu'un nombre fini de n impairs pour lesquels m_q soit la valeur absolue de la trace du Frobenius sur k d'une courbe d'invariant ± 1. Plus généralement, soit E une courbe elliptique définie sur un corps fini $\mathbf{F}_q$, de Frobenius π; si $a_{q^n} = \pi^n + \overline{\pi}^n$, il existe une constante c telle que, pour n impair ≥ 3, on a $|2q^{n/2} - |a_{q^n}|| \geq \frac{q^{n/2}}{n^c}$, quantité qui tend vers l'infini avec n. Ceci découle par exemple du fait que, si β est un nombre algébrique, ici $\pm\frac{\pi^n}{q^{n/2}}$, il existe une constante $c(\beta)$ telle que, pour tout entier $n \geq 2$ tel que $\beta^n \neq 1$, on a

$$|\beta^n - 1| > n^{-c(\beta)}.$$

En fait, dans le cas $j = 1$, où $\pi = \pm\frac{1+\sqrt{-11}}{2}$, (resp. $j = 2$, pour lequel $\pi = \pm 1 + \sqrt{-2}$) il semble que le seul n pour lequel il existe une courbe d'invariant j optimale sur $\mathbf{F}_{3^n}$ soit $n = 5$ (resp. $n = 3$).

Dans ces deux cas, il n'existe pas de courbe de genre 3 optimale sur $\mathbf{F}_{3^n}$, puisqu'on est dans les cas où il n'existe pas de module indécomposable de rang 3 (cf. [Lauter2], Appendice).

3) Dans le cas où $q = 3^5$ (donc $m_q = 31$), Lauter montre ([Lauter2], p. 14, Prop. 6) que pour toute courbe C de genre 3 sur $k = \mathbf{F}_q$, on a $|q + 1 - \operatorname{Card} C(k)| \leq 3m_q - 3$, et qu'il existe une courbe C_0 pour laquelle on a égalité, le signe de $q + 1 - \operatorname{Card} C_0(k)$ n'étant pas connu (*ibid.*, Note 4.1.5).

Les courbes de genre 3 ci-dessus permettent en fait de montrer qu'il existe, et de construire effectivement, une courbe C de genre 3 telle que $\operatorname{Card} C(k) = 3^5 + 1 + 3m_q - 3$. En effet, l'invariant de la courbe elliptique optimale sur k, dont la trace du Frobenius vaut 31, est $J_1 = 1$; soit z une racine de $z^5 - z + 1$; z engendre k^*, et les invariants des courbes elliptiques dont la trace du Frobenius vaut $31 - 3 = 28$ sont z^{38}, z^{77} et leurs conjugués.

Prenons $J_2 = z^{38\times 3}$. D'après ce qui précède, il existe une courbe C_{a_1,a_3} définie sur k, avec $a_3 = -1/J_2$, dont la jacobienne est k-isogène à $E_1^2 \times E_2$, E_1 et E_2 d'invariants respectifs J_1 et J_2; l'invariant de Hasse de chacune de ces deux courbes est $a_3(a_3+1)$, c'est-à-dire, à un carré près, $1 - J_2$; sa norme vaut 2, et est donc congrue à $-28 = -(m_q - 3) \mod 3$. Par suite, la trace du Frobenius de E_1 est -31 et celle de E_2 est -28; donc la courbe de genre 3 associée a un nombre de points égal à $3^5 + 1 + 3m_q - 3$.

3.2 Le cas $a_3 = 2$

Dans le paragraphe précédent, on a supposé $a_3 \neq 2$; si $a_3 = -1$, le discriminant de la courbe $a_1T_1^4 + a_2T_1^2T_2 - T_1T_3 + T_2^2 = 0$ est $-a2^9$; par chacune des trois involutions naturelles, elle a comme quotient la courbe elliptique d'invariant nul et d'équation $y^2 = x^3 + a_2x + 2a_1 + a_2^2$, et la courbe elliptique quotient par le sous-groupe d'ordre 3 engendré par $(X, Y, Z) \mapsto (Y, Z, X)$ est aussi d'invariant nul, et a comme équation

$$y^2 = x^3 + a_2a_1^2x + 2a_1^4.$$

Supposons que $-a_2$ ne soit pas un carré dans $\mathbf{F}_q$, où $q = 3^n$. L'application $x \mapsto x^3 + a_2x$ étant bijective, le nombre de points de chacune des deux courbes précédentes est égal à $q + 1$. Par suite, dans $\mathbf{F}_{3^{2n}}$, ces courbes sont optimales, d'où des courbes de genre 3 sur $\mathbf{F}_{3^{2n}}$ non hyperelliptiques et optimales.

Références.

[Auer-Top] Roland Auer, Jaap Top, Some Genus 3 Curves with Many Points. ANTS 2002.

[Ciani] E. Ciani, I Varii Tipi Possibili di Quartiche Piane pi ‘ u Volte Omologico-Armoniche,*Rend. Circ. Mat. Palermo* 13 (1899), 347-373.

[Elkies], The Klein Quartic in Number Theory, The Eightfold Way, MSRI Publications, Volume 35, 1998.

[Ibukiyama] Ibukiyama, T.: On rational points of curves of genus 3 over finite fields, *Tohoku Math J.* 45 (1993), 311-329.

[La-Ritz] Lachaud Gilles, Ritzenthaler Christophe. On a conjecture of Serre on abelian threefolds. *Algebraic Geometry and its applications (Tahiti, 2007)*, 88115. World Scientific, Singapore, 2008

[Lauter1] K. Lauter, Geometric methods for improving the upper bounds on the number of rational points on algebraic curves over finite fields. Lauter, Kristin, with an appendix in French by J.-P. Serre. *J. Algebraic Geom.* 10 (2001), no. 1, 19–36.

[Lauter2] K. Lauter, The maximum or minimum number of rational points on genus three curves over finite fields, with an Appendix by J-P. Serre, *Compositio Math.* 134 (2002) 87-111.

[Manin] Ju. I. Manin. The Hasse-Witt matrix of an algebraic curve. *Trans. Amer. Math. Soc.*, 45:245-246, 1965 (English translation of a Russian original)

[Na-Rit1] E. Nart, C. Ritzenthaler. Genus 3 curves with many involutions and application to maximal curves in characteristic 2, *arXiv*:0905.0546v1

[Na-Rit2] E. Nart, C. Ritzenthaler, Jacobians in isogeny classes of supersingular abelian threefolds in characteristic 2, *Finite Fields and their applications*, 14, (2008), 676-702.

[Ritzenthaler], C. Rltzenthaler, Explicit Computations of Serre's obstruction for genus 3 curves and application to optimal curves, arXiv:0901.2920.

[Serre Harvard] J.-P. Serre, Rational Points on curves over finite fields. Notes by F. Gouvea of lectures at Harvard University, 1985.

[Serre], J.-P. Serre, Propriétés galoisiennes des points d'ordre fini des courbes elliptiques. *Inventiones mathematicae*, volume 15; 259-331.

[Top] J. Top, Curves of genus 3 over small finite fields, *Indag. Math.* (N.S.) 14, (2003), 275-283.

Département de Mathématiques, Université Paris 7,
175 rue du Chevaleret, 75013 Paris, France
E-mail: mestre@math.jussieu.fr